

## BUDDLEJACEAE WILH.

Por Eduardo Martínez Carretero

Árboles, arbustos, raro hierbas. Hojas opuestas, raramente alternas o verticiladas. Estípulas, foliáceas, en ocasiones reducidas a una línea. Flores en cimas agrupadas en inflorescencias compuestas terminales o axilares. Flores actinomorfas o leve zigomorfas, tetrámeras ocasionalmente pentámeras. Cáliz 4-lobulado. Corola tubulosa, hipocrateriforme, campanulada, lóbulos imbricados raro valvados. Estambres soldados a la corola, alternipétalos. Ovario súpero, estilo único, estigma bilobado, globoso. Fruto cápsula septicida o luculicida. Semillas pequeñas, a menudo aladas.

En Argentina sólo el género *Buddleja*

### BIBLIOGRAFÍA

Norman, E. y L. Ariza Espinar, 1995. Buddlejaceae. Flora Fanerogámica Argentina. *PROFLORA* fascículo 10. ISSN 0328-3453.

Norman, E., 2000. Buddlejaceae. *Fl. Neotr. Monogr.* 81: 1-225.

### *Buddleja* L.

Árboles o arbustos, raro subarbustos. Hojas opuestas, simples, enteras, crenadas, tomentosas en ambas caras o solo en la abaxial. Estípulas reducidas a una línea que une las bases foliares. Flores perfectas, en glomérulos cimosos ubicados en las axilas de las hojas superiores. Cáliz 4-lobado, exterior tomentoso. Corola tetralobada, campanulada o tubulosa, blanca, amarilla a cremosa anaranjada. Estambres 4, alternos con los lóbulos de la corola, sésiles a subsésiles. Ovario súpero, estigma bilobado. Fruto cápsula tetravalvada.

En Mendoza se encuentran dos especies.

### BIBLIOGRAFÍA

Smith, L., 1937. Sinopsis de las especies argentinas del género *Buddleja*, *Lilloa* 1: 397-415.

Ariza Espinar, L., 1973. Notas sobre Buddlejaceae argentinas. *Kurtziana* 7: 153-163.

Bravo, L., 1983. Loganiaceae. En: A. Cabrera, *Flora de la Provincia de Jujuy* 8: 39-54.

Flores en cabezuelas globosas, una terminal. Hojas tomentosas en la cara superior.

1. ***B. araucana***

Flores en cabezuelas semiesféricas, en las axilas de las hojas superiores. Hojas tomentosas en ambas caras. Inflorescencia de 2-5 pares de címulas.

2. ***B. mendozensis***

1. ***Buddleja araucana*** Phil.

Anales Univ. Chile 43: 525-526, 1873.

*Buddleja nappii* Lorentz

*Buddleja globosa* var. *araucana* (Phil.) Reiche

Arbusto de hasta 1-3 m de alto. Hojas sésiles, lineares a lanceoladas; línea estipular conspicua, coriáceas, tomentosas en ambas caras, base angostamente connada. Flores en cabezuelas pedunculadas, una terminal y 1-4 pares en la axila de las hojas superiores. Cáliz tubuloso, exteriormente tomentoso. Corola subhipocrateriforme, tomentosa exteriormente, cremosa-anaranjada. Estambres sésiles. Ovario tomentoso, estigma claviforme. Fruto cápsula oblongo-ovoidea. Semillas con alas pequeñas. (Martínez Carretero 5089, Ruiz Leal (MERL) 21399) (**Figura 1**).

En el sur de Mendoza comúnmente en laderas de derrubios, entre los 300 y 1300 m.

2. ***Buddleja mendozensis*** Benth.

DC, Prodrumus 10: 443, 1846.

*Buddleja tenuifolia* Griseb.

*Buddleja lucae* Niederl.

*Buddleja mendozensis* var. *tenuifolia* (Griseb.) Hieron.

*Buddleja kurtzii* Kraenzl.

Arbusto de 0,3-2m de alto, ramas jóvenes tomentosas. Hojas pecioladas, oblongo-lanceolada, línea estipular delgada; lámina membranácea, envés tomentoso o lanoso, ápice agudo, margen entero o aserrado. Flores en cabezuelas pequeñas de 2-5 pares, en las axilas de las hojas terminales o subterminales. Cabezuelas sésiles o subsésiles. Cáliz tubuloso, exterior tomentoso. Corola subcrateriforme, exterior tomentosa, cremoso-anaranjada. Estambres sésiles. Ovario tomentoso, estigma claviforme. Fruto cápsula cilíndrica, dehiscencia septicida y loculicida hacia el ápice. Semillas sin alas. (Martínez Carretero 5092, Ruiz Leal (MERL) 6254) (**Figura 2**).

En Mendoza desde el norte en Las Heras (Uspallata) al sur en San Rafael, entre los 500 y 2500 m, normalmente en laderas rocosas y afloramientos rocosos de exposición norte.



**Figura 1.** *Buddleja araucana*:  
a: rama, b: flor

**Figura 2.** *Buddleja mendozensis*:  
a: rama, b: hoja, c: flor.  
(De la iconoteca del Museo Botánico de la  
Universidad Nacional de Córdoba)

